

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP -8-4-65 388844

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

ABONNEMENT ANNUEL

(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.

C. C. P. DUCH 5.465-19

Supplément n° 1 au Bulletin n° 55 - AVRIL 1965

7 AVRIL 1965

V I G N E

NOCTUELLES : Localement, les noctuelles peuvent provoquer des dommages importants.

Surveiller attentivement les bourgeons et dès la constatation de dégâts (bourgeons évidés), appliquer :

- soit un traitement, en pulvérisation, à l'aide de D.D.T. à forte dose (600 à 800 grammes de produit commercial par hectolitre d'eau), ou de D.D.T. + Lindane, à la dose préconisée par le fabricant.

- soit par appâts empoisonnés, à base de son et de H.C.H. (1 Kg de produit actif pour 100 Kgs de son), ou d'Aldrin, ou de Chlordane.

Les appâts doivent être répandus le soir, à la dose de 60 à 80 Kgs par hectare, par petits tas au pied des souches.

M.B. - Des spécialités commerciales sous forme de granulés tout préparés sont d'un emploi facile.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER & DU POINIER : La surface foliaire se multipliant rapidement du fait des conditions climatiques très favorables au développement de la végétation, il est recommandé d'effectuer un traitement anti-tavelure avec l'un des produits préconisés sur la liste des produits homologués.

OIDIUM DU POINIER : Il est rappelé que les traitements anti-oidium nécessitant des quantités de bouillie importantes, doivent être très soignés, ils seront complétés par l'éradication des pousses oïdiées au fur et à mesure de leur développement.

PETITS FRUITS

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER : Les premières ascospores différenciées et colorées ayant été observées, il convient pour éviter des contaminations possibles d'effectuer un traitement avec un fongicide à forte persistance d'action tel que les sels de cuivre à 250 grammes de matière active.

PUCERONS DU GROSEILLIER & DU CASSIS : Les jeunes feuilles ont commencé à réagir à la piqûre des mères fondatrices. Utiliser un aphicide de préférence systémique.

ANTHRACNOSE DU GROSEILLIER : Dans les plantations contaminées les années précédentes, effectuer un traitement dès la fin de la floraison avec un orychlorure de cuivre.

CULTURES LÉGUMIÈRES

PUCERONS SUR EPINARDS : Les premières colonies sont apparues. Il est conseillé de surveiller les cultures et d'intervenir s'il y a lieu avec l'un des produits indiqués dans l'édition spéciale à la rubrique : "Pucerons cultures légumières".

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

794

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100